


**Baccalauréat S Antilles-Guyane**
  
 septembre 2002

**EXERCICE 1**

**enseignement obligatoire**

1. Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_1 = \frac{1}{2}$  et par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{1}{6}u_n + \frac{1}{3}.$$

- a. Soit la suite  $(v_n)$  définie pour  $n \geq 1$  par  $v_n = u_n - \frac{2}{5}$  ; montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison.
- b. En déduire l'expression de  $v_n$  en fonction de  $n$  puis celle de  $u_n$ .
2. On considère deux dés, notés A et B. Le dé A comporte trois faces rouges et trois faces blanches. Le dé B comporte quatre faces rouges et deux faces blanches.
- On choisit un dé au hasard et on le lance : si on obtient rouge, on garde le même dé, si on obtient blanc, on change de dé. Puis on relance le dé et ainsi de suite.
- On désigne par  $A_n$  l'évènement « on utilise le dé A au  $n$ -ième lancer »,  
 par  $\overline{A_n}$  l'évènement contraire de  $A_n$ ,  
 par  $R_n$  l'évènement « on obtient rouge au  $n$ -ième lancer »,  
 par  $\overline{R_n}$  l'évènement contraire de  $R_n$ ,  
 par  $a_n$  et  $r_n$  les probabilités respectives de  $A_n$  et  $R_n$ .

- a. Déterminer  $a_1$ .
- b. Déterminer  $r_1$ . Pour cela, on pourra s'aider d'un arbre.
- c. En remarquant que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $R_n = (R_n \cap R_n) \cup (R_n \cap \overline{R_n})$ , montrer que  $r_n = -\frac{1}{6}a_n + \frac{2}{3}$ .
- d. Montrer que, pour tout  $n \geq 1$ ,  
 $A_{n+1} = (A_n \cap R_n) \cup (\overline{A_n} \cap \overline{R_n})$ .
- e. En déduire que, pour tout  $n \geq 1$ ,  
 $a_{n+1} = \frac{1}{6}a_n + \frac{1}{3}$ , puis déterminer l'expression de  $a_n$  en fonction de  $n$ .
- f. En déduire l'expression de  $r_n$  en fonction de  $n$  puis la limite de  $r_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

**EXERCICE 2**

**enseignement obligatoire**

Dans le plan complexe rapport au repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  (unité graphique : 5 cm), on considère les points A et B d'affixes respectives

$$z_A = 1 + i \quad \text{et} \quad z_B = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

On désigne par  $(\mathcal{C})$  le cercle de centre O et de rayon 1.

1. Donner la forme trigonométrique de  $z_A$  et celle de  $z_B$ .
2. Dans la suite de l'exercice,  $M$  désigne un point de  $(\mathcal{C})$  d'affixe  $e^{i\alpha}$ ,  $\alpha \in [0 ; 2\pi]$ .  
 On considère l'application  $f$  qui tout point  $M$  de  $(\mathcal{C})$ , associe  $f(M) = MA \times MB$ .
- a. Montrer, pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , l'égalité suivante :

$$e^{i2\alpha} - 1 = 2ie^{i\alpha}.$$

b. Montrer l'égalité suivante :  $f(M) = \left| e^{i2\alpha} - 1 - \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \right) e^{i\alpha} \right|$ .

c. En déduire l'égalité suivante :  $f(M) = \sqrt{\frac{1}{4} + \left( -\frac{3}{2} + 2\sin\alpha \right)^2}$ .

3. a. En utilisant 2 c, montrer qu'il existe deux points  $M$  de  $(\mathcal{C})$ , dont on donnera les coordonnées, pour lesquels  $f(M)$  est minimal. Donner cette valeur minimale.
- b. En utilisant 2 c, montrer qu'il existe un seul point  $M$  de  $(\mathcal{C})$ , dont on donnera les coordonnées, pour lequel  $f(M)$  est maximal. Donner cette valeur maximale.


**EXERCICE 2** **enseignement de spécialité**  
 Dans le plan, on considère deux segments  $[AC]$  et  $[BD]$  tels que

$$AC = BD \quad \text{et} \quad \left( \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD} \right) = -\frac{\pi}{2}.$$

On désigne par  $M$  le milieu de  $[AC]$  et par  $N$  celui de  $[BD]$ . On appelle  $(\mathcal{C}_1)$ ,  $(\mathcal{C}_2)$ ,  $(\mathcal{C}_3)$  et  $(\mathcal{C}_4)$  les cercles de diamètres respectifs  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ .

On pourra s'aider de la figure ci-jointe.

1. a. Soit  $r$  la rotation qui transforme  $A$  en  $B$  et  $C$  en  $D$ . Quel est l'angle de  $r$ ?  
 Montrer que le centre  $I$  de  $r$  appartient aux cercles  $(\mathcal{C}_1)$  et  $(\mathcal{C}_3)$ .
- b. Soit  $r'$  la rotation qui transforme  $A$  en  $D$  et  $C$  en  $B$ . Quel est l'angle de  $r'$ ?  
 Montrer que le centre  $J$  de  $r'$  appartient aux cercles  $(\mathcal{C}_2)$  et  $(\mathcal{C}_4)$ .
- c. Quelle est la nature du quadrilatère  $INJM$ ? On désigne par  $P$  et  $R$  les points diamétralement opposés à  $I$  sur, respectivement  $(\mathcal{C}_1)$  et  $(\mathcal{C}_3)$  et par  $Q$  et  $S$  les points diamétralement opposés à  $J$  sur, respectivement  $(\mathcal{C}_2)$  et  $(\mathcal{C}_4)$ .
2. Soit  $s$  la similitude directe de centre  $I$ , de rapport  $\sqrt{2}$  et d'angle  $\frac{\pi}{4}$ .
- a. Quelles sont les images par  $s$  des points  $D$ ,  $N$ ,  $B$ ?
- b. En déduire que  $J$  est le milieu de  $[PR]$ .



**PROBLÈME**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; 1[$  par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 0 \\ f(x) = (\ln x) \times \ln(1-x), \text{ pour } x \in ]0; 1[ \end{cases}$$

où  $\ln$  désigne la fonction logarithme népérien. On note  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans un repère orthonormal (unité graphique : 10 cm).

On admet que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ , ainsi que le résultat suivant :

$$\text{pour } \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = 0.$$

**Partie A - Étude de la fonction  $f$**

1. a. Déterminer la limite quand  $x$  tend vers 0 de l'expression  $\frac{\ln(1-x)}{x}$ .  
 b. En déduire la limite quand  $x$  tend vers 0 de l'expression  $\frac{f(x)}{x}$  ; que peut-on en déduire pour la courbe  $\mathcal{C}$  ?
2. Montrer que pour tout  $x \in \left] -\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right[$ ,  $f\left(\frac{1}{2}-x\right) = f\left(\frac{1}{2}+x\right)$ .  
 Que peut-on en conclure pour  $\mathcal{C}$  ?
3. Soit  $\varphi$  la fonction définie sur  $]0; 1[$  par :

$$\varphi(x) = (1-x) \ln(1-x) - x \ln x.$$

- a. Déterminer  $\varphi'(x)$ , puis montrer l'égalité  $\varphi''(x) = \frac{2x-1}{x(1-x)}$  ; en déduire les variations de  $\varphi'$  sur  $]0; 1[$ .
- b. Montrer que  $\varphi'$  s'annule en deux valeurs  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  sur  $]0; 1[$  (on ne cherchera pas à calculer ces valeurs). Donner le signe de  $\varphi'$  sur  $]0; 1[$ .

- c. Déterminer la limite quand  $x$  tend vers 0 de l'expression  $\varphi(x)$  et la limite quand  $x$  tend vers 1 de  $\varphi(x)$ . Calculer  $\varphi\left(\frac{1}{2}\right)$ . En déduire le signe de  $\varphi(x)$  sur  $]0; 1[$ .
4. a. Montrer que  $f'(x)$  a même signe que  $\varphi(x)$  sur  $]0; 1[$ .  
 b. Donner le tableau de variations de  $f$ .  
 c. Montrer que, pour tout  $x \in ]0; 1[$ , les inégalités suivantes sont vraies :

$$0 < (\ln x) \times \ln(1-x) \leq (\ln 2)^2.$$

- d. Tracer  $\mathcal{C}$ .

### Partie B - Encadrement d'une intégrale

Pour  $t \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$ , on pose :

$$I_1(t) = \int_t^{\frac{1}{2}} x \ln x \, dx, \quad I_2(t) = \int_t^{\frac{1}{2}} x^2 \ln x \, dx, \quad I(t) = \int_t^{\frac{1}{2}} f(x) \, dx.$$

1. a. À l'aide d'intégrations par parties, montrer que :

$$I_1(t) = -\frac{\ln 2}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{2}t^2 \ln t + \frac{t^2}{4};$$

$$I_2(t) = -\frac{\ln 2}{24} - \frac{1}{72} - \frac{t^3 \ln t}{3} + \frac{t^3}{9}.$$

- b. Déterminer les limites de  $I_1(t)$  et de  $I_2(t)$  quand  $t$  tend vers 0.

2. Soit  $g$  et  $h$  les fonctions définies sur  $\left]0; \frac{1}{2}\right[$  par :

$$g(x) = -\left[x + \frac{x^2}{2}\right] \quad \text{et} \quad h(x) = g(x) - \frac{x^2}{2}.$$

- a. Étudier sur  $\left]0; \frac{1}{2}\right[$  les variations de la fonction

$$x \mapsto \ln(1-x) - g(x).$$

- b. En déduire que, pour tout  $x \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$  :

$$\ln(1-x) \leq g(x).$$

- c. Par un procédé analogue, montrer que pour tout  $x \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$  :

$$\ln(1-x) \geq h(x).$$

- d. En déduire un encadrement de  $f(x)$  sur  $\left]0; \frac{1}{2}\right[$ .

3. a. Montrer que  $-I_1(t) - \frac{1}{2}I_2(t) \leq I(t) \leq -I_1(t) - I_2(t)$ .

- b. En supposant que  $I(t)$  admet une limite notée  $\ell$  quand  $t$  tend vers 0, donner un encadrement de  $\ell$ .